

# DANH MỤC SẢN PHẨM

CATALOGUE

## BẢO VỆ MÙA MÀNG

## NÂNG CAO NĂNG SUẤT

2025



## CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP AVN

Tên quốc tế

BIO AVN LIMITED LIABILITY COMPANY

MST

**0316905968**

Địa chỉ

*Toà S1 - Tháp A1 Sunshine City Sài Gòn, số 23 Phú  
Thuận, P. Tân Phú , Q. 7, TP HCM*

Hotline

**0944 704 234**



THUỐC TRỪ SÂU

# EMA 6.5WG

## THÀNH PHẦN

- 1. Emamectin benzoate: 6.5% w/w
- 2. Special Additives: 93.5%w/w



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng phòng trị | Liều lượng    |
|-----------|---------------------|---------------|
| Lúa       | Sâu cuốn lá         | 0.2-0.3 kg/ha |

Thời gian cách ly: 7 ngày

Liều dùng: Pha gói 100g cho bình 200 lít nước, phun ướt đều tán lá cây trồng.  
Lượng nước phun 400 lít/ha, phun thuốc khi sâu tuổi 1-2

## CÔNG DỤNG

Emamectin benzoate là thuốc trừ sâu sinh học có tác động vị độc, tiếp xúc, làm tê liệt hệ thần kinh côn trùng.

Sản phẩm thể hệ mới với dạng hạt cốm hoạt chất Emamectin benzoate đặc trị sâu cuốn lá, rầy nâu hại lúa. Ngoài ra, thuốc có tác dụng trị Sâu tơ, sâu xanh hại Bắp, Sâu khoang hại Lạc (đậu phộng).



QUY CÁCH:

100gr x 100 gói

# THUỐC TRỪ SÂU TUYẾN TRÙNG

## THÀNH PHẦN

1. Carbosulfan: 50g/kg
2. Special Additives



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng   | Liều lượng    | Cách dùng                                                                    |
|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cà phê    | Tuyến trùng | 20 - 30 kg/ha | Rải thuốc vào đầu mùa mưa khi thời tiết thuận lợi để tuyến trùng phát triển. |

Thời gian cách ly: 14 ngày

## CÔNG DỤNG

Đặc trị tuyến trùng và rệp sáp hại rễ cà phê, tiêu, thanh long, cây có múi; rầy nâu, sâu đục thân, muỗi hành hại lúa; sùng đục củ khoai lang và các loài sâu hại trong đất khác.

Để phát huy tối đa hiệu quả của thuốc, nếu đất khô phải tưới nước làm ẩm đất trước khi rải thuốc. Khi rải vào gốc cây, nên xới nhẹ xung quanh gốc theo tán cây tránh đứt rễ, rải thuốc xong lấp đất lại.

Có thể thuốc rất độc với mối, bọ hà, sùng đất, sâu đục thân...



**QUY CÁCH:**

1kg x 25 gói

# THUỐC TRỪ SÂU

# KUN 350

## THÀNH PHẦN

1. Chlorfenapyr 25%w/w
2. Indoxacarb 10%w/w
3. Special Additives



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng       | Liều lượng | Lượng nước   |
|-----------|-----------------|------------|--------------|
| Ngô (Bắp) | Sâu keo mùa thu | 250 ml/ha  | 400-500 l/ha |

Cách dùng: pha chai 150 ml cho 200 lít nước.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày

## CÔNG DỤNG

Chlorfenapyr là hoạt chất có cơ chế diệt trừ côn trùng độc đáo, sau khi bị nhiễm thuốc Chlorfenapyr nhanh chóng chuyển hoá thành chất gây độc mạnh làm côn trùng mất năng lượng trong ty thể. Cơ chế đặc biệt này làm thuốc có hiệu quả nhanh và kéo dài ngay cả với các sâu hại khó trị.

Indoxacarb sau khi xâm nhập vào cơ thể côn trùng làm tê liệt kênh vận chuyển Natri+ trong hệ thần kinh trung ương côn trùng. Côn trùng ngay lập tức ngừng ăn, run rẩy, tê liệt và chết.

Đồng phân đối quang S-Indoxacarb hỗn hợp với Chlorfenapyr được sản xuất với dạng thuốc SC tiên tiến đã tạo nên hiệu quả diệt trừ côn trùng tuyệt đối của sản phẩm.



**QUY CÁCH:**

100ml x 100; 200ml x 40 chai

# THUỐC TRỪ SÂU **THI AVN**



## THÀNH PHẦN

1. *Thiamethoxam 35%w/w*
2. *Special Additives 65%w/w*

## TỔNG QUAN

| <i>Cây trồng</i> | <i>Đối tượng phòng trị</i> | <i>Liều lượng</i> |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| Lúa              | Rầy nâu                    | 0.3 lít/ha        |

Thời gian cách ly: 14 ngày

Cách dùng: Pha chai 200ml cho 200-400 lít nước.

Lượng nước phun: 320-500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cảm ra rộ.

## CÔNG DỤNG

Hoạt chất Thiamethoxam trên Thế Giới và ở Việt Nam đã chấp thuận cho đăng kí phòng trừ đối với nhóm côn trùng chích hút: rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ: rệp sáp, rầy thánh giá, bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ nhậy, rệp muội trên Lúa, Cà phê, Chè, Tiêu, Điều, Thanh long, Xoài, Cây có múi, Cây ăn trái và Rau củ quả



**QUY CÁCH:** 20ml x 500; 240ml x 40 chai

THUỐC TRỪ SÂU

# DUCA PLUS

## THÀNH PHẦN

- 1. Profenofos 450g/l
- 2. Thiamethoxam 100g/l
- 3. Special Additives



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng phòng trị       | Liều lượng     |
|-----------|---------------------------|----------------|
| Lúa       | Rầy lưng trắng<br>Rầy nâu | 0.8-1.0 lít/ha |

Thời gian cách ly: 7 ngày  
Cách dùng: Pha chai 480 ml với 400-500 lít nước. Lượng nước phun 400-1000 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2

## CÔNG DỤNG

Hỗn hợp độc đáo giữa nhóm Lân hữu cơ và Neonicotinoid có tính tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn và đặc biệt có khả năng thấm sâu cực tốt và chuyển vị cực nhanh nên tác động siêu mạnh lên tất cả các nhóm côn trùng: miệng nhai, miệng gặm và chích hút trên bề mặt lá cũng như bám dưới bề mặt lá. Hỗn hợp thuốc diệt triệt để, nhanh chóng rầy, rệp còn non, trưởng thành và trứng nên hiệu quả sau 3 giờ phun và kéo dài.



# THUỐC TRỪ SÂU

## RAYXANHPLUS



### THÀNH PHẦN

1. Abamectin 30g/l
2. Imidacloprid 90g/l
3. Special Additives

### TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng phòng trị | Liều lượng  |
|-----------|---------------------|-------------|
| Lúa       | Sâu đục bẹ          | 0.25 lít/ha |

Thời gian cách ly: 7 ngày (khoảng thời gian tính từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch).

Pha 20ml cho 25-30 lít nước. Pha chai 240ml cho 200-400 lít nước. Lượng nước phun: 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện.

### CÔNG DỤNG

Hỗn hợp Abamectin và Imidacloprid có phổ tác động rộng, phòng trừ được nhiều đối tượng gây hại như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ, rệp sáp, rầy thảnh giá, bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ nháy, rệp muội trên lúa, cà phê, chè, tiêu, điều, thanh long, xoài, cây có múi, cây ăn trái và rau củ quả.

Lưu ý: đặc biệt hiệu quả với rầy xanh trên cây có múi và cây công nghiệp.



**QUY CÁCH:**

240ml x 40 chai

# THUỐC TRỪ BỆNH

# AZO PLUS

## THÀNH PHẦN

1. Azoxystrobin 210g/l
2. Difenconazole 130g/l
3. Hexaconazole 50g/l



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng phòng trị | Liều lượng |
|-----------|---------------------|------------|
| Lúa       | Lem lép hạt         | 0.4 lít/ha |

Chai 240ml pha cho 200-400 lít nước  
Lượng nước phun: 400-500 lít/ha  
Phun khi lúa trổ lác đặc và khi lúa đã trổ đều.  
Thời gian cách ly: 14 ngày.

## CÔNG DỤNG

Thuốc có chứa hoạt chất Azoxystrobin, Difenconazole, Hexaconazole đã được công nhận trên Thế giới và ở Việt Nam có công dụng trong việc phòng, điều trị nấm bệnh trên cây trồng.



# THUỐC TRỪ BỆNH **AVN COL**



## THÀNH PHẦN

1. Metalaxyl-M 80g/kg
2. Propineb 420g/kg
3. Special Additives 500g/kg

## TỔNG QUAN

| Đối tượng phòng trị      | Liều lượng & cách dùng                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Phần trắng trên hoa hồng | Liều lượng: 1.2 - 1.3 kg/ha.<br>Lượng nước phun: 400 - 600 lit/ha |

Pha 350g cho phuy 200 lít nước.  
Thời gian cách ly: 7 ngày

## CÔNG DỤNG

Sản phẩm là thuốc trừ bệnh phổ rộng trên các loại cây trồng. Thuốc có khả năng tiếp xúc mạnh và thấm sâu, phòng trừ hiệu quả các bệnh hại cây trồng. Đặc biệt hiệu quả trừ bệnh phần trắng.



**QUY CÁCH:**

350gr x 40 gói

THUỐC TRỪ BỆNH

# AVN ONE

## THÀNH PHẦN

1. Fenoxanil 20%w/w
2. Kresoxim methyl 6%w/w
3. Special Additives



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Lượng nước       |
|-----------|-----------|------------|------------------|
| Cà phê    | Thán thư  | 0.25%      | 600 - 800 lít/ha |

Liều dùng pha 200 ml cho 200-300 lít nước. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.  
Thời gian cách ly: 10 ngày

## CÔNG DỤNG

Fenoxanil và Kresoxim Methyl là hoạt chất mới được ứng dụng để kiểm soát thán thư trên cà phê, bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúa, phấn trắng, thán thư, đốm vòng trên nhiều loại cây và rau màu khác.

Thuốc có tính nội hấp mạnh, có thể di chuyển đến khắp các bộ phận của cây, ức chế sự hình thành melanin. Thuốc có dạng huyền phù đậm đặc với ưu điểm nổi trội là bám dính tốt, không sợ bị mưa rửa trôi.

Tác dụng ức chế mạnh đối với sự nảy mầm của bào tử và sự phát triển của sợi nấm nội bào. Ức chế sản xuất ethylene nên giúp dưỡng xanh lá đồng đến khi thu hoạch.

Đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh thán thư, thối quả trên cây ổi và cây sầu riêng.



**QUY CÁCH:** 20ml x 400; 200ml x 40 chai

# THUỐC TRỪ BỆNH **TIN AVN**



## THÀNH PHẦN

1. Difenconazole 150g/l
2. Propiconazole 150g/l
3. Special Additives

## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng phòng trị | Liều lượng |
|-----------|---------------------|------------|
| Lúa       | Khô vằn             | 0.3 lít/ha |
| Lúa       | Lem lép hạt         | 0.4 lít/ha |

Thời gian cách ly: 14 ngày

Liều dùng:

- Pha 20-30 ml cho bình 25 lít. Lượng nước phun 320 lít/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện

## CÔNG DỤNG

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo hai hoạt chất Difenconazole và Propiconazole với cơ chế phòng trừ mạnh mẽ, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh, đặc trị khô vằn, lem lép hạt.



**QUY CÁCH:**

240ml x 40 chai

# THUỐC TRỪ BỆNH **META 250**

## THÀNH PHẦN

1. *Metalaxyl: 250g/l*
2. *Spacial Additives*



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng phòng trị | Liều lượng |
|-----------|---------------------|------------|
| Hồ tiêu   | Chết nhanh          | 0.3%       |

Cách dùng: Pha 20-25ml cho bình 25 lít, chai 240ml pha cho 1 phuy 200 lít nước. Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%

## CÔNG DỤNG

- Hoạt chất Metalaxyl có đặc tính nội hấp và lưu dẫn mạnh, đặc biệt hiệu quả trong việc phòng và trị các chủng nấm thuộc nhóm Oomycetes đặc biệt là 2 chủng nấm *Pythium* và *Phytophthora*. Hai chủng nấm này chính là nguyên nhân gây nên các bệnh thối rễ, thối thân, thối trái... trên cây trồng.
- Sản phẩm được hấp thụ qua lá, thân và rễ, sau đó vận chuyển khắp trên cây trồng nên rất hiệu quả phòng trừ triệt để nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng như: hồ tiêu, cao su, nho, cam, sầu riêng...



**QUY CÁCH:**

240ml x 40 chai

# THUỐC TRỪ BỆNH **MK VIL 5SC**



## THÀNH PHẦN

1. Hexaconazole 50 g/lít
2. Spacial Additives

## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng            | Liều lượng   | Lượng nước                       |
|-----------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Lúa       | Khô vằn<br>(Đốm vằn) | 0.8-1 lít/ha | Pha 40-50 ml/bình<br>25 lít nước |

Lượng nước: phun 400- 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10%  
Thời gian cách ly: 7 ngày

## CÔNG DỤNG

- Cơ chế tác động của Hexaconazole là kìm hãm sự tách methyl của steroid dẫn đến sự kìm hãm sinh tổng hợp ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh) làm ngừng sự phát triển của ống mầm và sợi nấm, ngăn cản sự hình thành giác bám, giác mút và ức chế sự nảy mầm bào tử. Nấm bệnh sẽ bị cô lập và ngừng phát triển do chúng không thể hình thành được tế bào mới.
- Hoạt chất Hexaconazole tác dụng kép nên giúp cây sạch bệnh và giúp cây khỏe, sạch lá chân, nhanh ra lá non, xanh lá và đầy lá.



**QUY CÁCH:**

1lít x 20 chai

# THUỐC TRỪ BỆNH **KHUẨN**



## THÀNH PHẦN

1. Bismertiazol 200g/kg
2. Streptomycin Sulfate: 50g/kg
3. Special Additives

## TỔNG QUAN

| Đối tượng       | Liều lượng  | Cách dùng                       |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Bạc lá trên lúa | 1-1.2 kg/ha | Phun thuốc khi tỉ lệ bệnh 5-10% |

Pha 20g cho 20 lít nước. Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha.  
Thời gian cách ly: 05 ngày sau khi phun

## CÔNG DỤNG

- Hoạt chất Bismertiazol có ưu điểm nổi bật là làm khô nhanh vết sẹo, tác động nội hấp, ngấm sâu, lưu dẫn tạo công dụng cao cùng hiệu quả lâu dài.
- Hoạt chất Streptomycin Sulfate chuyên đặc trị vi khuẩn, giúp cây trồng ngăn ngừa và trị vi khuẩn tấn công.
- Hỗn hợp thuốc với tác động cộng hưởng của hai kháng sinh mạnh nhất vừa có tính tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn nên khô nhanh vết bệnh, hiệu lực kéo dài.
- Bột siêu mịn, dễ tán, bám dính tốt.



**QUY CÁCH:** 25gr x 400 gói; 250gr x 40 gói

# PHÂN BÓN LÁ

## COMBI HUU CO

### THÀNH PHẦN

Chất hữu cơ: 32%; Axit fulvic (axit fulvic): 21%;  
NAA: 0,007%; Kẽm (Zn): 500 ppm;  
Sắt (Fe): 500 ppm; Đồng (Cu): 500 ppm;  
Bo (B): 200 ppm; Mangan (Mn): 500 ppm;  
Độ ẩm: 10%; pHH2O: 7.



### TỔNG QUAN

Pha 5g cho bình 20-25 lít nước, pha 50g cho phuy 200 lít nước. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần. Có thể phun và tưới từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch cho tất cả các loại cây trồng.

### CÔNG DỤNG

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu được nhập khẩu cung cấp đầy đủ các vi lượng cần thiết cho cây trồng ở dạng 100% Chelate.

Sản phẩm giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, ngăn ngừa và giảm hiện tượng rụng trái non, tăng năng suất và phẩm chất nông sản.

Sản phẩm được sản xuất trên nền hữu cơ làm xanh và dày lá, bền cây, tăng khả năng ra rễ, giúp cây chống chịu được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.



THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

# ADEMON



## THÀNH PHẦN

Sodium-5-Nitroguaiacolate: 3.45 g/l  
Sodium-P-Nitrophenolate: 10.35 g/l  
Sodium-O-Nitrophenolate: 6.9 g/l  
Sodium-2,4 Dinitrophenol: 1.73 g/l

## TỔNG QUAN

Pha 10ml cho bình 20-25 lít nước

## CÔNG DỤNG

Ademon là hoạt chất từ thiên nhiên không gây ung thư.

Ademon giúp giảm sốc cho cây khi khí hậu khắc nghiệt nắng nóng hay mưa dầm; bị phèn, ngộ độc hữu cơ, đất sét nặng.

Ademon kích thích hạt giống nảy mầm nhanh, ra rễ nhiều, dễ nhánh và ra chồi khỏe.

Ademon kích thích lúa: trổ sớm, trổ thoát, trổ rộ và trổ đều.

Ademon kích thích ra bông đồng loạt và tăng tỉ lệ đậu trái non.

Ademon ngăn cản sự nảy mầm bào tử nấm bệnh và vi khuẩn.



**QUY CÁCH:** 10ml x 1000 gói; 100ml x 100 chai; 200ml x 40 chai

# THUỐC TRỪ CỎ

# GLU AVN

## THÀNH PHẦN

1. Glufosinate ammonium 200g/l
2. Special Additives



## TỔNG QUAN

| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Lượng nước (lít/ha) | Thời điểm sử dụng                |
|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------------------|
| Cà phê    | Cỏ        | 3.0 lít/ha | 500 - 600 lít/ha    | Phun khi cỏ đang phát triển mạnh |

\* Pha 100ml cho bình 18 - 20 lít nước.

Thời gian cách ly: Không xác định.

Lưu ý: Thuốc trừ cỏ tiếp xúc không chọn lọc nên cần dùng phễu chụp phun định hướng vào cỏ. Tránh để thuốc bay tạt vào các bộ phận còn xanh như lá, chồi non, thân còn xanh của cây cà phê và các loại cây trồng khác. Phun ướt đều thân và lá cỏ.

## CÔNG DỤNG

Sản phẩm là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, KHÔNG CHỌN LỌC, thế hệ mới. Thuốc có tác dụng tiếp xúc, phổ tác động rộng; diệt trừ các loại cỏ dại (cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp hàng năm và lâu năm) trên đất khai hoang, đất trồng cây công nghiệp, cây ăn quả như: cỏ chỉ, cỏ tranh, cỏ mần trầu, cỏ thài lài, cỏ gấu, cỏ chác lác, xuyên chi...

Thuốc có nguồn gốc sinh học nên không gây hại cho đất, ít độc với môi trường.



# EXA 30SL

## THÀNH PHẦN

1. Polyalkyleneoxide Modified 30%
2. Special Additives



## TỔNG QUAN

Liều lượng:

Pha 50ml cho 200 lít nước, Pha chai 240ml cho 1000l nước

Thời gian cách ly:

Dựa theo thuốc chính cần phun xịt.

## CÔNG DỤNG

Tăng hấp thụ thuốc BVTV vào các mô tế bào, giúp cho thuốc BVTV, phân bón, thuốc trừ cỏ không bị rửa trôi khi gặp trời mưa.

Tiết kiệm thuốc, nước phun;

Loang trải, bám dính và thẩm thấu sâu.



**QUY CÁCH:** 50ml x 100 chai; 240ml x 40 chai

THUỐC TRỪ SÂU | THUỐC TRỪ CỎ | THUỐC TRỪ BỆNH | PHÂN BÓN LÁ & ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG



Bền vững cho tương lai



**CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP AVN**



Sunshine City Sài Gòn, số 23 Phú Thuận, P. Tân Phú, Q. 7, TP HCM



Hotline: 0944 704 234