

CÔNG TY TNHH KIMAGRI VIETNAM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



(Lưu hành nội bộ)

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trang bìa

Thư ngỏ

Trang 03

PHÂN BÓN NHẬP KHẨU CHÂU ÂU

ORGANFUL

Trang 04

HERO VITAL

Trang 06

THUỐC TRỪ SÂU

DIMECIDE 40EC

Trang 08

KUNGOLD 35SC

Trang 09

THUỐC TRỪ BỆNH

VALXTRA 7.5SC

Trang 10

X-GLIDER 350SC

Trang 11

DOVABEAM 600SC

Trang 12

DIEBIALA 20SC

Trang 13

OLI GOLD 100WP

Trang 14

BAVACOL 500WP

Trang 16

BEST HARVEST 15SC

Trang 17

THUỐC DIỆT CHUỘT

NEMESIS 0.75TP

Trang 18

THƯ NGỎ

Quý khách hàng thân mến!

Lời đầu tiên, chúng tôi xin thay mặt **công ty TNHH kimagri Việt Nam** gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công.

Công ty TNHH kimagri Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của **kimagri Corporation Sdn. Bhd. (Malaysia)**, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Chúng tôi chuyên sản xuất, nhập khẩu, phân phối và phát triển các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các giải pháp sinh học từ những đối tác quốc tế uy tín như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và Mỹ,....

Với sứ mệnh kết nối công nghệ nông nghiệp tiên tiến với nông dân Việt Nam, kimagri cam kết mang đến những giải pháp hiệu quả, an toàn và bền vững, góp phần nâng cao giá trị cây trồng và tăng thu nhập cho người nông dân.

kimagri Corporation Sdn. Bhd., trụ sở tại Malaysia, là một công ty giải pháp nông nghiệp cam kết thúc đẩy các hoạt động bền vững và dựa trên khoa học trong toàn ngành. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, chúng tôi đã trở thành một thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm bảo vệ cây trồng chất lượng cao và tiên tiến. Là một công ty tích hợp hoàn toàn, **kimagri** vận hành phòng thí nghiệm được chứng nhận OECD-GLP, một nhà máy pha chế dung dịch cô đặc (SC) hiện đại và sở hữu 22 đăng ký sản phẩm trên các phân khúc chính của ngành hóa chất nông nghiệp. Danh mục sản phẩm của chúng tôi phục vụ đa dạng các loại cây trồng, bao gồm cả giống lúa – được hỗ trợ bởi bằng sáng chế gen lúa biến đổi độc quyền, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với công nghệ sinh học và an ninh lương thực.

Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ mở rộng sang sản xuất nguyên liệu hoạt tính, nhằm tăng cường tích hợp theo chiều dọc và nâng cao khả năng cạnh tranh dài hạn tại khu vực ASEAN và xa hơn. Năng lực R&D và kinh nghiệm quản lý của kimagri giúp chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy trong các thị trường phức tạp và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

 hoan nghênh sự hợp tác chiến lược với các bên có trình độ và tầm nhìn xa, để cùng khai thác các mối quan hệ đối tác tiềm năng, dựa trên tăng trưởng chung, tính minh bạch và giá trị bền vững.

TPHCM, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Tổng Giám Đốc



Lee Kim Chai

ORGANFUL /O-Gan-Phun/

PHÂN BÓN LÁ NHẬP KHẨU CAO CẤP



RỄ KHỎE - XANH LÁ - HOA ĐẸP - TRÁI NGỌT - LÚA TRỮ BÔNG - NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

1 Thành phần

Chất hữu cơ 25%, Kali hữu hiệu (K_2O_{hh}): 4%; Tỷ lệ C/N: 12; pH 5, Tỷ trọng: 1,26

2 Công dụng

Giúp cải thiện cấu trúc của đất, giải phóng các chất dinh dưỡng, tăng cường hoạt động sinh học và thúc đẩy quá trình ra rễ. Kích thích quá trình trao đổi chất của cây, bảo vệ cây khỏi các điều kiện khắc nghiệt và phục hồi cây trồng bị suy yếu.

Cây ăn trái

Sau thu hoạch:

- Giải độc, làm mát cây, giúp phục hồi nhanh vườn sau khi thu hoạch.
- Kích thích ra đợt non khỏe mạnh, rễ phát triển mạnh mẽ.

Giai đoạn ra hoa:

- Tăng sức sống, hạn chế rụng hoa, giúp hoa nở đồng loạt, bền và đậu tốt.

Giai đoạn đậu và nuôi trái:

- Giúp cây khỏe mạnh, tăng khả năng nuôi trái.
- Vỏ trái xanh tươi, bóng đẹp, màu sắc sáng và đồng đều.
- Tăng trọng lượng và năng suất.

Cây rau

Sử dụng giai đoạn cây con có thể phun hoặc tưới định kỳ cách nhau 7- 10 ngày với liều 1ml/ 1 lít nước.

- **Giúp cây con phát triển nhanh, bộ rễ khỏe, thân mập lá dày.**
- Tăng khả năng chống chịu thời tiết, hạn chế sâu bệnh.
- Giúp rau màu xanh tươi, năng suất cao, chất lượng đồng đều.
- Kích thích phục hồi sau mưa, ngập úng hoặc thời tiết bất lợi.

Cây hoa

Sử dụng giai đoạn sinh trưởng đến ra hoa cách nhau 10 – 15 ngày có thể phun hoặc tưới.

Giúp cây hoa sinh trưởng mạnh, lá xanh dày, thân khỏe.

Kích thích ra nụ đồng loạt, hoa nở đều, màu sắc tươi rực rỡ.

Tăng độ bền hoa, kéo dài thời gian trưng bày và thương phẩm.

Phục hồi nhanh sau cắt tỉa, thời tiết khô hạn hoặc úng nước.

Cây lúa

Liều lượng: 1 lít/ha (phun bằng Drone).

- Kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam nhiều nhà nông đánh giá cao với chia sẻ sản phẩm Organful: **"Cây lúa khỏe – bông to – hạt sáng chắc – năng suất cao".**

Hiệu quả vượt trội:

- Tạo bông to dài, trổ đồng đều, hạn chế nghẹn bông.
- Giúp lúa vào gạo nhanh, chắc hạt, hạn chế lem lép, giữ lá bông xanh đến thu hoạch.
- Hạt sáng bóng, chắc nặng, năng suất vượt trội.

Thời điểm phun:

- Đẻ nhánh: hỗ trợ ra rễ, tăng nhánh, tiết kiệm 20% phân bón.
- Làm bông: tăng sức đề kháng, giúp bông to và khỏe.
- Trước trổ: giúp trổ đồng loạt chống nghẹn bông, hạn chế lem lép hạt.
- Sau trổ: giúp hạt chắc đều, sáng bóng, chín đều.

Cây công nghiệp

Phun hoặc tưới với liều 1 ml/1 lít nước định kỳ 2 – 3 tháng/lần.

Giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch và duy trì sức sinh trưởng ổn định quanh năm.

Kích thích ra rễ khỏe, tán lá xanh dày, cành nhánh phát triển mạnh.

Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt.

- Lưu ý : Đây là phân bón nhập khẩu nguyên kiện nên **rất mạnh và không nên sử dụng quá liều. Nhập từ nhà máy phân bón đã có trên 100 năm và thuộc Top đầu châu Âu.**

HERO VITAL /Hi-Rô-Vai-Tô/ PHÂN BÓN LÁ NHẬP KHẨU CAO CẤP



1 Thành phần

Thành phần	% khối lượng/thể tích (% m/V)	% khối lượng/khối lượng (% m/m)
Tổng axit amin (Total amino acids)	63.5	50
Axit amin tự do (Free amino acids)	11.4	9
Tổng nitơ (N) (Total nitrogen)	11	8.7
Nitơ hữu cơ (N) (Organic nitrogen)	10.2	8
Tổng chất hữu cơ (Total organic matter)	68.6	54
Carbon hữu cơ (C) (Organic carbon)	39.9	31.4

Hero vital là chất kích thích sinh học cao cấp dạng lỏng chứa Free amino acids từ động vật và nitrogen (N) cao cấp.

2

Công dụng

- Tăng sức đề kháng cho cây trồng, giúp chống chịu điều kiện bất lợi (như hạn hán, ngập úng, các điều kiện bất lợi từ thời tiết, khí hậu,...).
- Tăng khả năng phản ứng của cây trồng với điều kiện stress và đẩy nhanh quá trình phục hồi hoặc sau thu hoạch.
- Cải thiện sự đồng hóa phân bón lá khoáng, tạo điều kiện hấp thụ và vận chuyển vi chất dinh dưỡng.
- Tăng nồng độ chất diệp lục trong cây.
- Thúc đẩy ra hoa, đậu quả, giảm rụng hoa và quả non.
- Cải thiện chất lượng nông sản: trái to, màu sắc đồng đều, trái chắc, tăng độ ngọt (độ Brix).
- Tăng năng suất và tỉ lệ trái nguyên, hiệu quả kinh tế cao hơn.
- Tối ưu quang hợp và hấp thụ dinh dưỡng nhờ thành phần axit amin, peptide và nitơ hữu cơ.
- Đạm axit amin tự do được chiết xuất từ nguồn gốc động vật, cây hấp thụ được ngay, không cần phân giải.

Có thể sử dụng qua lá, tưới gốc hoặc tưới nhỏ giọt.

3

Hướng dẫn sử dụng

- Phương pháp: Phun qua lá, tưới gốc hoặc tưới nhỏ giọt. (có thể phun bằng Drone).
- Liều lượng khuyến nghị:
- Cây ăn trái, công nghiệp, rau, hoa: 1 – 5 L/ha/lần (tùy loại cây và giai đoạn phát triển).
- Pha 1 ml/1 lít nước khi phun trực tiếp.
- Thời điểm phun:
- Cấy ghép hoặc Sau thu hoạch: thúc đẩy rễ, phục hồi cây.
- Sinh trưởng: kích thích lá, thân và rễ.
- Ra hoa – đậu quả: tăng tỷ lệ đậu quả, đồng đều.
- Quả chín: tăng màu sắc, độ ngọt và độ đồng đều trái.
- Trước hoặc sau stress: giúp cây phục hồi nhanh.

Lưu ý:

- Không sử dụng cho các loài nhạy cảm với việc bón axit amin, chẳng hạn như cây mận.
- Nếu nghi ngờ, hãy thử nghiệm trước.

Nhà sản xuất: Herogra Group (nhà máy đã có trên 100 năm tại Tây Ban Nha).

4

Quy cách

1000 ml

DIMECIDE 40EC /Đai-mi-xai/

Giải pháp trị rệp sáp, bọ xít trên đồng ruộng



1 Thành phần

Dimethoate:400g/l

2 Công dụng

DIMECIDE 40EC là thuốc trừ sâu có phổ phòng trị phổ rộng, hiệu lực cao và kéo dài đối với côn trùng miệng nhai và chích hút. Dùng trừ **bọ xít hại lúa và rệp sáp hại xoài**.

3 Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng
Lúa	Bọ xít	40-50ml/bình 16 lít. Phun 3 bình cho 1000m ² . Phun khi bọ xít mới xuất hiện. Có thể phun lặp lại khi áp lực bọ xít quá cao.
Xoài	Rệp sáp	Pha 450ml/phuy 200 lít nước. Phun ướt đều trên tán cây phun khi rệp sáp mới xuất hiện. Khi áp lực rệp sáp cao có thể phun lặp lại.

- Lượng nước phun: 400 - 600 lít/ha.
- Phun ướt đều cây trồng và phun thuốc khi đối tượng gây hại xuất hiện nhiều
- Phun lặp lại 7- 10 ngày sau nếu áp lực sâu hại cao.
- Có thể kết hợp với các thuốc khác, trừ những thuốc có tính kiềm cao.
- Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc 14 ngày trước khi thu hoạch.

KUNGOLD 35SC

Đặc trị sâu kháng /Côn-gôn/



1 Thành phần

Chlorfenapyr 25% w/w
Indoxacarb 10% w/w

2 Công dụng

Kinh nghiệm nông dân đã sử dụng và chia sẻ Kungold 35SC đặc trị được Sâu cuốn lá, Sâu xanh da láng, Sâu đục thân, Sâu tơ, Sâu keo mùa thu.

Chlorfenapyr là hoạt chất có cơ chế diệt trừ côn trùng độc đáo, sau khi bị nhiễm thuốc Chlorfenapyr nhanh chóng chuyển hoá thành chất gây độc mạnh làm côn trùng mất năng lượng trong ty thể. Cơ chế đặc biệt này làm thuốc có hiệu quả nhanh và kéo dài ngay cả với các sâu hại khó trị.

Indoxacarb sau khi xâm nhập vào cơ thể côn trùng làm tê liệt kênh vận chuyển Natri+ trong hệ thần kinh trung ương côn trùng. Côn trùng ngay lập tức ngừng ăn, run rẩy, tê liệt và chết.

Đồng phân đối quang S -Indoxacarb hỗn hợp với Chlorfenapyr được sản xuất với dạng thuốc SC tiên tiến và phụ gia đặc biệt từ kimagri đã tạo nên hiệu quả diệt trừ côn trùng tuyệt đối của sản phẩm KUNGOLD 35SC.

3 Hướng dẫn sử dụng

Thuốc được đăng ký trừ sâu keo mùa thu trên Ngô (Bắp)

Liều lượng: 250 ml/ha. Lượng nước 400-600 lít/ha.

Liều dùng : Pha 10ml cho bình 16 đến 25 lít nước.

Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày

VALXTRA 7.5SC

Lá xanh – Sạch bệnh /Van-Xờ-Tra/



1

Thành phần

Hexaconazole 5%
Validamycin 2.5%

2

Công dụng

Hoạt chất Hexaconazole 5% và Validamycin 2.5% trong sản phẩm ValXtra 7.5% SC là 2 hoạt chất vừa phòng trị được các loại bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra trên nhiều loại cây trồng như cây cao su, cà phê, sầu riêng, bưởi, lúa và một số cây khác...

3

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng
Ngô	Khô vằn	Liều lượng: 1 lít/ ha, lượng nước 400-600 lít/ha. Phun khi bệnh xuất hiện tỷ lệ bệnh khoảng 5%

Ở Việt nam, ValXtra 7.5SC đăng ký phòng trị bệnh khô vằn trên cây ngô và thuốc có tác dụng nội hấp, hiệu lực trừ bệnh nhanh, kéo dài.

- ValXtra 7.5SC có thể phòng trị nấm hồng trên cây cao su hoặc bệnh mắt cua trên cây sầu riêng.

X-GLIDER 350SC

Xanh lá – Đẹp hạt /Éch-G-Lai/



1 Thành phần

**Azoxystrobin 200g/l
Difenconazole 150g/l**

2 Công dụng

X-GLIDER 350SC là thuốc trừ nấm trên nhiều loại cây trồng có tác dụng nội hấp, lưu dẫn có hiệu lực phòng trừ bệnh kéo dài. Tại Việt Nam được đăng ký phòng trừ bệnh thán thư trên cà phê

3 Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng
Cà phê	Thán thư	Liều lượng 0.15- 0.20% pha 600 – 800 lít nước/ha Phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện, khi tỉ lệ bệnh khoảng 5%. Phun lặp lại khi áp lực bệnh cao. Phun ướt đều tán cây
Lúa	Đạo ôn Lem lép hạt	Liều lượng: 0.35 lít/ha Phun trước khi lúa trổ và sau khi lúa đã trổ đều.

DOVABEAM 600SC

Chuyên gia trị đạo ôn /Đô-Va-Bim/



1 Thành phần

Tricyclazole 450 g/kg
Difenoconazol 150 g/kg

2 Công dụng

DOVABEAM 600SC - đặc trị đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô nhanh vết bệnh, chặn đứng lây lan bệnh, giúp lá đồng xanh, đứng, bông khỏe, hạt sáng, chắc.

Với phụ gia đặc biệt kimagri (Malaysia) không lo đổ chóp và hiệu quả kéo dài, hơn nữa thuốc dạng SC dễ tan giúp mát cây, cây lúa khỏe, xanh bẹ, xanh đồng, hạt sáng mẩy, bông đầy hạt, tối đa năng suất.

3 Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Đối tượng	Cách dùng
Lúa	Đạo ôn	Liều lượng: 12,5 – 18,75 ml/25 lít nước Phun khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh từ 5-10%, lượng nước phun 400-600 lít nước/ha.

Thời gian cách ly 14 ngày

DIEBIALA 20SC /ĐI-BIA-LA/ Đặc trị vi khuẩn bạc lá – xì mù



1 Thành phần

Bismethiazol 200g/l

2 Công dụng

DIEBIALA 20SC là thuốc đặc trị vi khuẩn cháy bìa lá lúa, xì mù xoài. Thuốc dạng sữa, kích thước hạt cực mịn nên khả năng bám dính, loang trải tốt, cây hấp thụ rất nhanh, ít bị rửa trôi, hiệu lực kéo dài.

DIEBIALA 20SC là thuốc trừ vi khuẩn lưu dẫn mạnh phân tán đều trong khắp các mô cây nên việc phòng và trị rất hiệu quả.

3 Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Đối tượng	Liều lượng
Xoài	Xì mù	Liều lượng: 15ml/10 lít nước Phun lượng nước 600-800 lít/ha. Phun khi tỉ lệ bệnh khoảng 5-10%.
Lúa	Bạc lá Cháy bìa lá	Liều lượng: 50ml/25 lít nước Phun 2-3 bình/1000m ² và lượng nước 400-500 lít/ha.

Thời gian cách ly: 7-10 ngày.

OLI GOLD 100WP

Đặc trị vi khuẩn- xanh lá! /Ô-li-gôn/

kimagri

OLI GOLD 100WP

ĐẶC TRỊ VI KHUẨN - XANH LÁ!



CẢNH BÁO:
Có thể có hại nếu nuốt phải,
hít phải hoặc khi tiếp xúc với da

THÀNH PHẦN:

Oligosaccharins	75 g/kg
Zhongshengmycin	25 g/kg
Phụ gia	900 g/kg

Đơn vị phân phối:
CÔNG TY TNHH KIMAGRI VIETNAM
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà Diamond Plaza, 34 Lê
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 0911550888
SDK: 8598/CNDKT-BVTV và 8256/CNDKT-BVTV
Số lô/Ngày sản xuất: Xem trên nhãn gói
Hạn sử dụng: 02 năm

Khối lượng tịnh: 50g

BIO
BIO-BASED



kimagri kimagri kimagri



Liều dùng: 120 g/Drone/ha (lúa)

1 Thành phần

- Oligosaccharins 75g/kg.
- Zhongshengmycin 25g/kg.
- Phụ gia 900g/kg.



2 Công dụng

OLI GOLD 100WP là thuốc trừ bệnh sinh học với hỗn hợp hai hoạt chất mới, dạng bột siêu mịn tan nhanh trong nước, lưu dẫn, thấm sâu tốt an toàn cho cây trồng và thân thiện với môi trường. Hai hoạt chất Oligosaccharins và Zhongshengmycin có hiệu quả cao trong việc phòng trừ các bệnh do vi khuẩn gây hại trên nhiều cây trồng đồng thời thúc đẩy các vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, ức chế một số loại nấm bệnh và tuyến trùng. Kích thích cây trồng phát triển tốt hơn, tăng năng suất và tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi.

OLI GOLD 100WP đã được đăng ký bệnh cháy bìa lá (bệnh bạc lá) trên cây lúa, héo xanh vi khuẩn cà chua, thối nhũn vi khuẩn hại hành.

Đặc biệt, với phụ gia đến từ kimagri (Malaysia) giúp nâng cao hiệu lực thuốc mạnh và lưu dẫn đồng thời giúp cây trồng:

- Sạch bệnh – Giúp cây khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh.
- Xanh cây – Lá xanh mướt, quang hợp tốt.
- Năng suất – Bông chắc hạt, sản lượng cao.
- Phù hợp cho nhiều loại cây trồng: lúa, rau màu, cây ăn trái...

3 Hướng dẫn sử dụng

Cách pha:

Pha 50gr cho 100 lít nước phun 1000m². Phun ướt đều tán lá cây trồng và phun lặp lại lần 2 sau 5-7 ngày sau khi phun lần 1.

Lưu ý:

Nên phun khi có tỉ lệ bệnh khoảng 5% để kiểm soát bệnh tốt nhất.



BAVACOL 500WP

Đặc trị bệnh cho cây trồng



1 Thành phần

**Metalaxyl-M 80g/kg
Propineb 420g/kg**

2 Công dụng

BAVACOL 500WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng trên nhiều cây trồng và kết hợp **với phụ gia đặc biệt đến từ kimagi (Malaysia)**. Thuốc có khả năng tiếp xúc mạnh và thẩm thấu 1 phần, phòng trừ các loại bệnh hại cây hoa hồng, đăng ký phòng trừ bệnh phấn trắng.

Với hoạt chất Metalaxyl-M lưu dẫn hai chiều giúp cây trồng tiêu diệt bệnh tận gốc.

- Mít: thối trái, héo rù, xì mù, thối rễ.
- Ớt: thán thư, nổ trái.
- Hoa (Huệ, Lan, Hoa Hồng): đốm lá, thán thư.
- Thanh long: đốm trắng, mắt cua, thối đầu cành.
- Dưa hấu: nứt thân, chảy nhựa, thán thư, héo vàng.
- Sầu riêng: xì mù chảy nhựa, thán thư, cháy lá thối hoa và trái, nấm hồng, gỉ sắt.
- Cây có múi: ghè nhám trên trái, xì mù trên thân, trên trái.
- Lúa: Đạo ôn lá, vàng lá, đạo ôn cổ bông, thán thư.

Đồng thời, nguyên tố Zinc ++ (kẽm) trong Propineb còn có tác dụng hỗ trợ cây phát triển xanh tốt.

Zinc ++(kẽm) trong Propineb giúp lá lúa thẳng đứng và quang hợp tốt.

Zinc ++(kẽm) trong Propineb giúp hiệu quả cao trong phòng bệnh và an toàn cho bông, trái.

3 Hướng dẫn sử dụng

Pha 30g cho bình 18 – 25 lít nước. Phun ướt đều tán lá cây trồng. Phù hợp với công nghệ Drone.

Nên phun sớm khi bệnh mới chớm xuất hiện. Thuốc có thể sử dụng để pha tưới gốc hoặc quét dung dịch thuốc lên vết bệnh nứt thân – xì mù

Nên phun sớm để kiểm soát bệnh vào đầu mùa mưa hoặc thời tiết có sương muối.

BEST HARVEST 15SC

/BẾT HA-VẾT/

Sạch bông xanh lá – Triệt phá mầm bệnh



1 Thành phần

Hexaconazole: 150g/l

2 Công dụng

BEST HARVEST 15SC có hoạt chất Hexaconazole thuộc nhóm Triazole có tác dụng nội hấp, thấm sâu, di chuyển và phân bố đều khắp trong các bộ phận của cây trồng, ức chế nhanh nguồn bệnh, giúp lá dày, cây khỏe mạnh. Best-Harvest 15SC hiệu quả cực mạnh trong trừ bệnh khô vằn hại lúa, rỉ sắt hại cà phê. Phù hợp cho máy bay không người lái (Drone).

3 Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Quản lý bệnh hại - Liều lượng - Thời gian cách ly
Lúa	Lem lép hạt, khô vằn: 500 ml/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện. Cách ly 14 ngày.
Thanh long	Đốm nâu: 15 ml/ 25 lít nước. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 7 ngày.
Cam	Ghè sẹo: 15 ml/ 25 lít nước. Lượng nước phun 600 - 800L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 7 ngày.
Ngô	Khô vằn: 500 - 1000 ml/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện. Cách ly 14 ngày.
Lạc	Đốm lá: 500 ml/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện. Cách ly 14 ngày.
Hoa hồng	Phấn trắng, rỉ sắt, đốm đen: 500ml /ha. Lượng nước phun 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện. Cách ly 14 ngày.
Cà phê	Rỉ sắt, nấm hồng: 500 - 1000 ml/ha. Lượng nước phun 600 - 800L/ha. Phun khi thấy 15% lá bị hại và cách ly 14 ngày.

Lưu ý: Phun thuốc ngay khi bệnh hại mới xuất hiện.

* Phun thuốc khi lúa trổ 5 - 7 ngày.

* Thời gian cách ly: không sử dụng trước khi thu hoạch 7 ngày.



Hoạt chất Hexaconazole và phụ gia đặc biệt trong sản phẩm Best Harvest 15SC giúp :

- Sạch bệnh xanh cây – Dưỡng lá đồng.
- Đặc trị nấm bệnh hại trên cây trồng.
- Chặn đột ức chế chồi ngọn.
- Đồng xanh, mật sáng mẩy, vô gạo nhanh, sáng bông, đầy hạt.

NEMESIS 0.75TP

Thuốc diệt chuột bầy đàn! / Nê-mê-xít/

“THUỐC CHUỘT KIMAGRI”



1

Thành phần

Coumatetralyl: 0.75% w/w

2

Chú ý an toàn

- Khi sử dụng thuốc diệt chuột phải mang găng tay, khẩu trang, không ăn, uống hay hút thuốc lá.
- Sau khi sử dụng thuốc xong nên thay quần áo và tắm giặt kỹ.
- Nên để bả trong dụng cụ đặt bả để dễ kiểm tra, tránh bả bị ẩm mốc, tránh thú nuôi ăn phải bả.
- Sau giai đoạn xử lý, nên thu gom và hủy bả còn dư, bao bì, xác chuột chết.

NEMESIS 0.75TP Thuốc diệt chuột bầy đàn từ Hàn Quốc! Hiệu quả vượt trội với công nghệ chống đông máu tiên tiến, giúp tiêu diệt chuột tận gốc chỉ sau vài ngày. Sau khi ăn phải bả, chuột sẽ bị xuất huyết nội tạng và chết từ từ, không gây mùi hôi, không để lại xác trong nhà.

- An toàn – Hiệu quả – Tiện lợi.
- Giải pháp thông minh cho nhà nông!
- Hấp dẫn với chuột.



KIMAGRI

BUGS ZONE
CO.,LTD

4 Hướng dẫn sử dụng

- Rắc: rắc một lớp bột dày 3 – 5 mm trước miệng hang, đường đi hay những nơi chuột ẩn nấp. Thuốc dính vào lông hay chân sẽ vào miệng do tập tính hay liếm của chuột. Sau khi rắc thuốc, để ít nhất 5 ngày, nên bổ sung thêm khi cần thiết.
- Tạo bả: trộn đều 1 phần thuốc với 20 phần thức ăn chuột ưa thích (cơm, cám, gạo, bắp...).
- Liều lượng: 100 – 200g bả / điểm đặt bả; 2 điểm / 50m². Thường xuyên kiểm tra và bổ sung bả khi chuột đã ăn thuốc.

Lưu ý:


- Nên để bả đã trộn trong dụng cụ đặt bả (có thể tận dụng các vật dụng thông thường như ống nước, ống tre, hộp gỗ, hộp nhựa, hộp carton có 2 lỗ ra, vào v.v...)
- Đặt thuốc ở các vị trí khác nhau và thay bả chuột khi có dấu hiệu chuột ăn tại địa điểm đó.
- Sử dụng liên tục đến khi số lượng bả chuột bị ăn ít hơn 20%.
- Thuốc có độc tính Coumatetralyl: 0,75% w/w nên cần phải bảo quản ở nơi khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ em, vật nuôi trong nhà và cần đưa ngay đến cơ sở y tế với bao bì thuốc nếu có người ăn nhầm phải thuốc để có biện pháp điều trị kịp thời.

Ưu điểm của thuốc diệt chuột Nemesis 0.75 TP (hay còn gọi là thuốc chuột kimagri)

- Thuốc diệt chuột Nemesis 0.75 TP được đóng gói 20g/gói chỉ cần đem ra trộn với mồi nhử chuột rất dễ sử dụng.
- Các con chuột ăn phải thuốc sẽ bị chết vì xuất huyết nội tạng do mất máu và có triệu chứng khát nước và thèm ánh sáng mặt trời, vì thế lũ chuột chết ở những nơi dễ phát hiện và tìm kiếm.
- Sau khi sử dụng thuốc diệt chuột Nemesis 0.75 TP thì chỉ sau 3-5 ngày chuột ăn phải thuốc sẽ chết dù là loại chuột cứng đầu và khó chết nhất.
- Thuốc trừ chuột Nemesis 0.75TP có thể sử dụng vào các điều kiện môi trường khác nhau, có thể dùng nguyên gói hoặc trộn chung với mồi nhử và cho kết quả rất tốt. Với đặc điểm này, dù bạn sử dụng Nemesis trong nhà ở, nhà kho, cơ sở sản xuất hay ngoài đồng ruộng đều hoàn toàn phù hợp, dùng cho các giống chuột khác nhau.
- Thuốc diệt chuột Nemesis 0.75 TP là sản phẩm do hãng BUGS ZONE (Hàn Quốc) sản xuất và công ty TNHH kimagri việt nam (Malaysia) phân phối tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, người tiêu dùng có thể tìm mua loại thuốc diệt này tại các cửa hàng kinh doanh thuốc thuốc bảo vệ thực vật hoặc côn trùng, hoặc các đại lý của kimagri Việt Nam để đảm bảo hàng chất lượng, chính hãng với mức giá hợp lý nhất, được nhân viên bán hàng tư vấn chi tiết thông tin về sản phẩm.

5 Quy cách

20 gram và 50 gram



CÔNG TY TNHH KIMAGRI VIETNAM

www.kimagri.com.vn

VĂN PHÒNG

Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê
Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ
Chí Minh, Vietnam.
T +84 984 333 098

SẢN XUẤT

PT23081, Kawasan Perindustrian
Tungzen, 31300 Kampung Kepayang,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
T +605 350 1032